

§ 2 Folgen

① Def (2.1) Eine Folge in $\mathbb{R}$ ist eine Abb. $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$
 $n \mapsto a_n$

n	1	2	3	4	5	...
a_n	$1/2$	$2/3$	$3/4$	$4/5$	$5/6$	...

Notation: $(a_n)_n$ oder $(a_1, a_2, a_3, \dots)$

Beisp: $a_n = 1/n$ $(1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots)$

$a_n = (-1)^n$ $(-1, 1, -1, 1, \dots)$

Def (2.4, 2.13) Sei $(a_n)_n$ Folge in $\mathbb{R}$

$(a_n)_n$ beschränkt: $\Leftrightarrow \exists K > 0 \forall n \in \mathbb{N}: |a_n| \leq K$

$\Leftrightarrow \exists r, s \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}: r \leq a_n \leq s$

$(a_n)_n$ monoton steigend: $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}: a_n \leq a_{n+1}$
 (bzw. mon. fallend) (bzw. $a_{n+1} \leq a_n$)

$(a_n)_n$ monoton $\Leftrightarrow (a_n)_n$ mon. steig. oder mon. fall.

Beisp

1) $a_n = \frac{3n+1}{n+2}$, $n \in \mathbb{N}$

Ist $(a_n)_n$ beschränkt?

$\forall n \in \mathbb{N}: 3n+1 \geq 0$ und $n+2 > 0 \Rightarrow a_n = \frac{3n+1}{n+2} \geq 0$

$\forall n \in \mathbb{N}: a_n = \frac{3n+1}{n+2} \leq \frac{3n+1}{\underset{n \leq n+2}{n}} = \frac{3n}{n} + \frac{1}{n} = 3 + \frac{1}{n} \leq 3 + 1 = 4$

Also: $\forall n \in \mathbb{N}: 0 \leq a_n \leq 4$, d.h. $(a_n)_n$ ist beschränkt

Ist $(a_n)_n$ monoton?

$a_1 = \frac{4}{3}$; $a_2 = \frac{7}{4}$; $a_3 = \frac{10}{5} = 2$

Vermutung: $\forall n \in \mathbb{N}: a_n \leq a_{n+1}$

$a_n \leq a_{n+1} \Leftrightarrow \frac{3n+1}{n+2} \leq \frac{3(n+1)+1}{(n+1)+2} = \frac{3n+4}{n+3}$

$\Leftrightarrow \frac{(3n+1)(n+3)}{3n^2+10n+3} \leq \frac{(3n+4)(n+2)}{3n^2+10n+8}$

$\Leftrightarrow 3 \leq 8$ Das ist richtig!

Also: $\forall n \in \mathbb{N}: a_n \leq a_{n+1}$, d.h. $(a_n)_n$ ist mon. steigend

2) Beh: $(b_n = (-1)^n + \sin(n))_n$ ist beschränkt

$\forall n \in \mathbb{N}: |b_n| = |(-1)^n + \sin(n)|$

$\leq \underbrace{|(-1)^n|}_{=1} + \underbrace{|\sin(n)|}_{\leq 1} \leq 1+1=2$

Δ -Ungl.

② Def (2.2) Eine Folge $(a_n)_n$ konvergiert gegen $a \in \mathbb{R}$: $\Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0: |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\begin{array}{c} \text{---}] \text{---} | \text{---} [\text{---} \\ a-\varepsilon \quad a \quad a+\varepsilon \end{array} \quad \mathcal{U}_\varepsilon(a)$$

d.h. $\forall \varepsilon > 0$: $U_\varepsilon(a)$ enthält fast alle Folgenglieder

Notation: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ oder $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$

Beispiel

1) $(a_n = a)_n = (a, a, a, \dots)$ konstante Folge

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a = a$$

2) $(a_n = \frac{1}{n})_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, d.h. $(\frac{1}{n})_n$ ist Nullfolge

3) $-1 < q < 1$, $(a_n = q^n)_{n \geq 0} = (1, q, q^2, \dots)$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0, \text{ d.h. } (q^n)_n \text{ ist Nullfolge}$$

Zusammenhang: Konvergenz, Beschränkth., Monotonie

2.4 Satz: Jede konvergente Folge ist beschränkt

2.13 Satz: Jede monotone und beschränkte Folge ist konvergent.

Im Bild

$$\boxed{(a_n)_n \text{ monot. und beschr.}} \xRightarrow{2.13} \boxed{(a_n)_n \text{ konverg.}} \xRightarrow{2.4} \boxed{(a_n)_n \text{ beschr.}}$$

Bemerk: Die Umkehrungen sind i. Allg. nicht richtig

z.B. $(a_n = \frac{(-1)^n}{n})_n$ ist konverg., aber nicht monoton
und $(a_n = (-1)^n)_n$ ist beschr., aber nicht konverg.

2.5 Lemma: $(a_n)_n$ Nullfolge, $(b_n)_n$ beschr. $\Rightarrow (a_n b_n)_n$ Nullfolge

③ Grenzwertsätze

2.6 Satz: Seien $(a_n)_n, (b_n)_n$ Folgen mit $a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a, b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} b$

Dann: $a_n \pm b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a \pm b$, $\alpha a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \alpha a$ für $\alpha \in \mathbb{R}$

$a_n \cdot b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a \cdot b$, $\frac{a_n}{b_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{a}{b}$ falls $b \neq 0 \neq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$

Beisp

1) Für $c \in \mathbb{R}, r \in \mathbb{N}$: $\frac{c}{n^r} = c \cdot \underbrace{\frac{1}{n} \cdot \dots \cdot \frac{1}{n}}_{r\text{-mal}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} c \cdot 0 \cdot \dots \cdot 0 = 0$

2) $\frac{3n^2 - n}{n^2 + 2} = \frac{n^2(3 - \frac{1}{n})}{n^2(1 + \frac{2}{n^2})} = \frac{3 - \frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{n^2}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{3 - 0}{1 + 0} = \frac{3}{1} = 3$

2.7 Satz: Seien $(a_n)_n, (b_n)_n, (c_n)_n$ Folgen mit
 $a_n \leq b_n \leq c_n$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$
und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = c$

Dann gilt:

1) $a \leq c$

2) $a = c \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$ "Sandwich-Prinzip"

2.8 Wichtige Beisp.

1) Für $a > 0$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

Def (2.9) Bestimmte Divergenz

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \quad (\text{oder } -\infty) : \Leftrightarrow \forall K > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : a_n > K \quad (a_n < -K)$$

Beisp

1) Für $r \in \mathbb{N}$: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^r = +\infty$

2) Für $q \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} 0 & \text{für } |q| < 1 \\ 1 & \text{" } q = 1 \\ +\infty & \text{" } q > 1 \\ \text{existiert nicht} & \text{für } q \leq -1 \end{cases}$$

§ 3 Reihen

④ Def (3.1) Sei $(a_k)_k$ Folge in $\mathbb{R}$

$$s_n := a_1 + \dots + a_n \quad \underline{n\text{-te Partialsumme}}$$

Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k := (s_n)_n$ Folge der Partialsummen

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergiert : $\Leftrightarrow (s_n)_n$ konvergiert

In diesem Fall:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k \quad \underline{\text{Wert der Reihe}}$$

3.2 Lemma: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverg. $\Rightarrow (a_k)_k$ ist Nullfolge

Bem.:

1) Die Umkehrung gilt i. Allg. nicht (z.B. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$)

2) Kontrapos.: $(a_k)_k$ keine Nullfolge $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverg.

3.4 Satz (Rechenregeln): Seien $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = A$, $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = B$ und $\alpha \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = A + B$ und $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha a_k = \alpha A$

⑤ Drei wichtige Reihen

Geometrische Reihe für $q \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & \text{falls } |q| < 1 \\ \text{diverg.} & \text{falls } |q| \geq 1 \end{cases}$$

Harmonische Reihe: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverg.

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ konverg. (allg. für $r \geq 2$: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^r}$ konverg.)

Beisp.: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k+3}}{4^k} = ?$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k+3}}{4^k} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^{k+4}}{4^{k+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^4}{4} \cdot \frac{2^k}{(\frac{1}{2})^k} \stackrel{3.4}{=} 4 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \\ &\quad \text{geom. Reihe, } q = \frac{1}{2} \\ &= 4 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 4 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} = 4 \cdot 2 = \underline{\underline{8}} \end{aligned}$$

⑥ Konvergenz-Kriterien

3.7 Satz: Seien $\sum_{k=1}^{\infty} a_k, \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ Reihen mit
 $0 \leq a_k \leq b_k$ für fast alle $k \in \mathbb{N}$

1) Majoranten-Krit.: $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverg. $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverg.

2) Minoranten-Krit.: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverg. $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ diverg.

Beisp: Ist $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k^2-5}{k^2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k$ konverg.?

$$\forall k \in \mathbb{N}: \frac{3k^2-5}{k^2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k \leq \frac{3k^2}{k^2} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k$$
$$\left. \begin{array}{l} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \text{ konverg.} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k \text{ konverg.} \\ (\text{geom. Reihe, } q = \frac{1}{2}) \end{array} \right\} \text{ 3.4}$$

$$\Rightarrow \text{Majo-Krit } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k^2-5}{k^2} \left(\frac{1}{2}\right)^k \text{ konverg.}$$

3.9 Def: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ absolut konverg. $:\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ konverg.

Satz: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ abs. konv. $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konv.

3.10 Quotienten-Kriterium

$$r := \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \begin{cases} < 1 \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ absolut konverg.} \\ > 1 \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ diverg.} \\ = 1 \Rightarrow \text{keine Aussage} \end{cases}$$

3.11 Wurzel-Kriterium

ähnl. wie Quot.-Krit. mit $r := \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}$

3.14 Leibniz-Kriterium

$(a_k)_k$ mon. fall. Nullfolge $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ konverg.

Beisp: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^2}$, $a_k = \frac{2^k}{k^2}$

$$\begin{aligned} \text{Quot: } \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| &= \frac{2^{k+1}}{(k+1)^2} \cdot \frac{k^2}{2^k} = 2 \cdot \left(\frac{k}{k+1}\right)^2 = 2 \cdot \left(\frac{k}{k(1+\frac{1}{k})}\right)^2 \\ &= 2 \cdot \frac{1}{(1+\frac{1}{k})^2} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{1}{(1+0)^2} = 2 \cdot \frac{1}{1^2} = 2 \end{aligned}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = 2 > 1 \Rightarrow \text{Quot.-Krit } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^2} \text{ divergiert.}$$

Wann welches Konvergenzkriterium? (Daumenregel)

Gegeben: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$

Fall $a_k \neq \frac{\text{Polynom}}{\text{Polynom}}$: Versuche Quot- oder Wurzel-Krit.

Fall $a_k = \frac{\text{Polynom}}{\text{Polynom}}$: Sei $r := \text{Zählergrad}$
 $s := \text{Nennergrad}$

z.B. $a_k = \frac{k^2 + 5}{k^3 + k}$, $r = 2$, $s = 3$

Fall $r \geq s$: Versuche Kontrapos. von 3.2

z.B. $a_k = \frac{k^2 + 3}{2k^2 - k} = \frac{\cancel{k^2}(1 + 3/k^2)}{\cancel{k^2}(2 - 1/k)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1+0}{2-0} = \frac{1}{2}$ //

$\Rightarrow (a_k)_k$ keine 0-Folge, d.h. $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ divergent

Fall $s = r+1$: Versuche Minor.-Kriterium mit
Minorante $\sum_{k=1}^{\infty} c \frac{1}{k}$, $c > 0$

Fall $s \geq r+2$: Versuche Major.-Kriterium mit
Majorante $\sum_{k=1}^{\infty} c \frac{1}{k^2}$, $c > 0$

§5 Grenzwerte von Funktionen, Stetigkeit

Sei $D \subset \mathbb{R}$

$\bar{D} := \{ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \mid (x_n)_n \text{ konvergent Folge in } D \}$ Abschluss von D

z.B. $\overline{]0,1[} = [0,1]$, $\overline{\mathbb{R} \setminus \{0\}} = \mathbb{R}$

⑦ Def (5.2) Sei $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ Funktion, $p \in \bar{D}$, $q \in \mathbb{R}$

$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q \iff$ Für jede Folge $(x_n)_n$ in D
mit $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p$ gilt: $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} q$

(5.3) Einseit. Grenzwerte $\lim_{x \uparrow p} f(x)$, $\lim_{x \downarrow p} f(x)$ ähnlich

Beisp

$f = c$ konst. Funkt. $\implies \lim_{x \rightarrow p} c = c$

$f = \text{id}$ ident. Funkt. $\implies \lim_{x \rightarrow p} x = p$

5.4 Grenzwertsätze: Seien $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$, $p \in \bar{D}$,
 $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$ und $\lim_{x \rightarrow p} g(x) = r$. Dann gilt:

1)-4) $\lim_{x \rightarrow p} (f+g)(x) = q+r$ und analog für $f-g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$

5) $f(x) \leq g(x)$ in Umgeb. von $p \implies q \leq r$

6) Sandwich-Prinzip: $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, $q=r \implies \lim_{x \rightarrow p} h(x) = q$

Beisp

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-8}{x^2-x-2} \stackrel{5.4}{=} \frac{1^3-8}{1^2-1-2} = \frac{-7}{-2} = \underline{\underline{\frac{7}{2}}}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{x^2-x-2} \left(= \frac{2^3-8}{2^2-2-2} = \frac{0}{0} \right) \text{ d.h. Grenzwertsatz klappt nicht}$$

Zerlege Zähler und Nenner

$$\begin{aligned} x^3-8 &= (x^2+2x+4)(x-2) \\ x^2-x-2 &= (x+1)(x-2) \end{aligned} \quad \leftarrow \text{gemeinsamer Faktor}$$

$$\implies \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{x^2-x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+2x+4}{x+1} \stackrel{5.4}{=} \frac{2^2+2 \cdot 2+4}{2+1} = \frac{12}{3} = \underline{\underline{4}}$$

uneigentliche Grenzwerte

Def (5.6) Sei $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ Funktion, $p \in \bar{D}$ oder $p \in \{\pm\infty\}$, falls D nicht nach oben bzw. unten beschr., und sei $q \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$


$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q : \Leftrightarrow$ Für jede Folge $(x_n)_n$ in D mit $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p$ gilt: $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} q$

Bem: Analog zu 5.4 gelten Grenzwertsätze

Beisp

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$



2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x-3} = ?$

$$\frac{2x+1}{x-3} = \frac{x(2+\frac{1}{x})}{x(1-\frac{3}{x})} = \frac{2+\frac{1}{x}}{1-\frac{3}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{2+0}{1-0} = \frac{2}{1} = \underline{\underline{2}}$$

(Beisp 1))

⑧ Stetigkeit

Def (5.7) Sei $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion

f stetig in $p \in D : \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$

f stetig : $\Leftrightarrow f$ stetig in jedem $p \in D$

Beisp (5.10, 5.18)

Polynome, exp, sin, cos, ln

Betragsfunktion $|\cdot|: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Wurzel-funktion $\sqrt{\cdot}: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$

} sind stetig

5.8 Satz: Seien $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig (in $p \in D$) und $\alpha \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow f+g, f-g, f \cdot g, \alpha f$ und f/g sind stetig (in p)

5.9 Satz: Kompositionen stetiger Funktionen sind stetig.

Beisp

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{\exp(2x^2+3)+5}{x^2+1} + \sin^2(x)$$

Ist f stetig?

Die Polynome $2x^2+3$, x^2+1 und 5 sind stetig, und die Funktionen $\exp$ und $\sin$ sind stetig. f ist aus diesen zusammengesetzt durch die algebr. Operationen $+$, $\cdot$ und $\div$ und die Komposition von Funktionen. Also ist f stetig.

5.11 Lemma: Sei $D \subset \mathbb{R}$ Intervall, $p \in D$ innerer Punkt.

Dann gilt: $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig in $p \in D \iff$

$$\lim_{x \nearrow p} f(x) = f(p) = \lim_{x \searrow p} f(x)$$

Beisp

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} \cos(x^2+x) & \text{für } x < 0 \\ \sqrt{x+1} & \text{für } x \geq 0 \end{cases}$$

Ist f stetig in $p=0$?

$$f(0) = \sqrt{0+1} = \sqrt{1} = 1$$

$$\lim_{x \nearrow 0} f(x) = \lim_{x \nearrow 0} \cos(x^2+x) \stackrel{\substack{\uparrow \\ \cos(x^2+x) \text{ stetig}}}{=} \cos(0^2+0) = \cos(0) = 1 = f(0)$$

$$\lim_{x \searrow 0} f(x) = \lim_{x \searrow 0} \sqrt{x+1} \stackrel{\substack{\uparrow \\ \sqrt{x+1} \text{ stetig}}}{=} \sqrt{0+1} = 1 = f(0)$$

Also: $\lim_{x \nearrow 0} f(x) = f(0) = \lim_{x \searrow 0} f(x)$, d.h. f stetig in $p=0$.

Wichtige Sätze über stetige Funktionen

5.13 Zwischenwertsatz

5.15 Satz vom Minimum und Maximum

Anwendung von ZWS

Beh: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5 + \cos(x^2)$ hat mind. eine Nullstelle

Bew: f ist stetig mit

$$\left. \begin{aligned} f(0) &= 3 \cdot 0 - 5 + \cos(0) = -5 + 1 = -4 < 0 \\ f(3) &= 3 \cdot 3 - 5 + \underbrace{\cos(9)}_{\geq -1} \geq 9 - 5 - 1 = 3 > 0 \end{aligned} \right\} \text{d.h. } f(0) < 0 < f(3)$$

8 $\xRightarrow{\text{ZWS}} \exists p \in [0, 3]: f(p) = 0$

§ 6 Differentialrechnung

Im Folg.: $D \subset \mathbb{R}$ mit $p \in D \setminus \{p\}$ für alle $p \in D$

⑨ Def (6.1) Sei $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ Funktion

f differenzierbar in $p \in D$: $\Leftrightarrow$ folg. Grenzwert existiert

$$f'(p) := \lim_{x \rightarrow p} \underbrace{\frac{f(x) - f(p)}{x - p}}_{\text{Differenzenquotient}} \in \mathbb{R} \quad \text{Ableitung von } f \text{ in } p$$

f differenzierbar: $\Leftrightarrow f$ diff. bar in jedem $p \in D$.


Dann: $f': D \rightarrow \mathbb{R}, p \mapsto f'(p)$ Ableitung von f

Sei $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ diff. bar in $p \in D$. Dann gilt:

6.3 f ist stetig in p

6.2 f hat lineare Approximation in p

$$g(x) = f(p) + f'(p)(x - p)$$



Wichtige Ableitungen (6.4, 6.8)

$$(const)' = 0, \quad (x^n)' = n x^{n-1} \quad \text{für } n \in \mathbb{N}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$\exp' = \exp, \quad \ln'(x) = \frac{1}{x}$$

$$\sin' = \cos, \quad \cos' = -\sin$$

6.5 Satz (Ableitungsregeln) Seien $D \xrightarrow{f} E \xrightarrow{u} \mathbb{R}$ diff. bar, $\alpha \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow f+g, \alpha f, f \cdot g, f/g$ und $\text{h} \circ g$ sind diff. bar, und es gilt:

$$(f+g)' = f' + g' \quad \text{Summenregel}$$

$$(\alpha f)' = \alpha f' \quad \text{Faktorregel}$$

$$(f \cdot g)' = f'g + f \cdot g' \quad \text{Produktregel}$$

$$(f/g)' = \frac{f'g - f \cdot g'}{g^2} \quad \text{Quotientenregel}$$

$$(\text{h} \circ g)' = (u' \circ g) \cdot g' \quad \text{Kettenregel}$$

Beisp: $f(x) = \sin(3x) e^{x^2-7x}$ ist diff. bar mit

$$f'(x) = \underbrace{3 \cos(3x)}_{\text{Prod.-u.}} \cdot e^{x^2-7x} + \underbrace{\sin(3x)}_{\text{Kett.-reg.}} (2x-7) e^{x^2-7x}$$

$$= (3 \cos(3x) + (2x-7) \sin(3x)) e^{x^2-7x}$$

⑩ Anwendungen: Monotonie, lokale Extrema

Def (6.14) $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ monoton steigend (bzw. fallend): $\Leftrightarrow$

$$\forall x, y \in D: (x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)) \\ (\text{bzw. } f(x) \geq f(y))$$

Satz: Für $D \subset \mathbb{R}$ Intervall und $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ diffbar gilt:

$$f \text{ mon. steig. (bzw. fall.)} \Leftrightarrow \forall x \in D: f'(x) \geq 0 \text{ (bzw. } \leq 0)$$


Beisp

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^{-x^2} \text{ diffbar}$$

$$f'(x) = -2x \underbrace{e^{-x^2}}_{>0} \text{ für alle } x \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow f'(x) \begin{cases} \geq 0 & \text{für } x \leq 0 \\ \leq 0 & \text{" } x \geq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Satz } f \text{ mon. } \begin{cases} \text{steigend auf } \mathbb{R}_{\leq 0} \\ \text{fallend " } \mathbb{R}_{\geq 0} \end{cases}$$



Inshes. hat f in $p=0$ ein (globales) Maximum

Lokale Extrema (Nicht klausurrelevant)

Sei $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ 2-mal diffbar. Dann gilt:

$$\boxed{\begin{matrix} f'(p) = 0 \\ f''(p) \neq 0 \end{matrix}}$$

$\xRightarrow{6.17}$

$$\boxed{f \text{ hat in } p \\ \text{lok. Extr.}}$$

$\xRightarrow{6.10}$

$$\boxed{f'(p) = 0}$$

hinreich. Beding.

notwend. Beding.

Beisp: $f(x) = e^{-x^2}$

$$f'(x) = -2x e^{-x^2}$$

$$f''(x) = -2e^{-x^2} - 2x(-2x)e^{-x^2} \\ = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$$

Notw. Beding.

$$f'(p) = 0 \Leftrightarrow -2p \underbrace{e^{-p^2}}_{>0} = 0 \Leftrightarrow p = 0$$

Hinreich. Beding.

$$f'(0) = 0$$

$$f''(0) = (4 \cdot 0^2 - 2)e^{-0^2} = -2e^0 = -2 < 0$$

$\Rightarrow f$ hat in $p=0$ ein lokales Maximum.